



## ¿Qué es Narcan®?

Narcan® (naloxona) se usa para tratar las sobredosis de opioides en situaciones de emergencia.

Funciona por medio de invertir los efectos de una sobredosis de opioides.



Atomizador nasal



Muscle injection

## IMPORTANTE

SIEMPRE llame al 9-1-1 de inmediato si piensa que alguien ha tomado una sobredosis, aun si ya se le ha administrado Narcan®.

Permanezca con la persona hasta que lleguen las asistencias. Si precisa dejarla sola, asegúrese de dejarla en posición de rescate (vea adentro).

## Recursos en Connecticut Trastornos por Uso de Opioides

Línea de acceso en CT: 860-563-4086  
Mapa localizador de recursos de CT  
MAT: [www.ctbhp.com](http://www.ctbhp.com)  
[liveloud.org](http://liveloud.org)  
[www.drugfreetct.org](http://www.drugfreetct.org)  
[www.ct.gov/dmhas](http://www.ct.gov/dmhas)  
[www.ctclearinghouse.org](http://www.ctclearinghouse.org)  
<http://bit.ly/CTprevention>  
<https://egov.ct.gov/norasaves>



[www.opioidresponsenetwork.org](http://www.opioidresponsenetwork.org)

Esta iniciativa ha sido financiada (en parte) por el subsidio N° 6H79TI080816 de SAMHSA. Las opiniones expresadas en los materiales impresos o publicaciones de conferencias y por los oradores y moderadores no necesariamente reflejan las políticas oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y la mención de marcas comerciales, prácticas comerciales u organizaciones no implica que las mismas sean patrocinadas por el Gobierno de los EE. UU.

## Seguridad con Narcan® (Naloxona) y Opioides

### Información General y Administración

PODRÍA SALVAR UNA VIDA ...

**EN CASO  
DE UNA  
SOBREDOSIS**

1.800.563.4086  
coming soon // [liveloud.org](http://liveloud.org)



La muerte por  
sobredosis puede  
prevenirse

Conozca los datos

# Qué hacer si sospecha de una sobredosis de opioides.

1

## ¿Es una sobredosis de opioides?

### Busque y escuche:

- Respiración lenta o detenida
- Gorgoteo, agitación o ronquidos
- Piel húmeda y fría
- Labios o uñas azulados
- Frascos de píldoras, agujas o alcohol



### Procure despertarlo:

- Agítelo y llámelo por su nombre
- Frote sus nudillos con fuerza sobre su esternón



**Si no despierta, ¡hay que actuar rápido!**

2

## Llame al 9-1-1

- Diga dónde está y si la persona no respira o no despierta.
- No es necesario que diga nada sobre drogas o medicamentos cuando llame.



3

## Administre Narcan®/naloxona y empiece la reanimación respiratoria

- **Administre la naloxona.** Siga las instrucciones dadas en el envase o en el juego de reanimación por sobredosis.
- **Empiece la reanimación respiratoria.** Si no responde en 3-5 minutos, administre una segunda dosis de naloxona. Continúe la reanimación respiratoria.



Efectúe la reanimación respiratoria aun si no tiene naloxona. **¡El oxígeno es crítico!**

4

## Permanezca con la víctima

- Si empieza despertar y respirar, permanezca con la víctima.
- **Permanezca con la víctima hasta que llegue la ayuda médica.** La naloxona pierde su efecto en 30-90 minutos. Si esto ocurre, la persona puede volver a dejar de respirar.
- Si le es necesario irse, coloque a la víctima en posición de recuperación y en un lugar en donde pueda ser hallada.



## Reanimación Respiratoria

- Incline la cabeza hacia atrás. Levántele el mentón. Pellízquele la nariz.
- Dé 2 respiraciones rápidas.
- El pecho deberá elevarse.
- Luego dé 1 respiración lenta cada 5 segundos.
- Continúe hasta que empiece a respirar por sí sola o que la ayuda llegue.



## Posición de Recuperación

