

Szczepionki ochronne



Dostałem zastrzyk w punkcie masowego szczepienia, co zawierał?

Jeżeli dostałeś zastrzyk, była to szczepionka ochronna. Szczepionkę

podaje się dla ochrony przed zapadnięciem na niektóre choroby.

Dlaczego dostałem tę szczepionkę?

Szczepionkę dostałeś dlatego, że miałeś lub mogłeś mieć kontakt z czymś, co mogłoby spowodować bardzo poważną chorobę. Szczepionka ta pomoże uchronić się od zapadnięcia na taką chorobę.

Miejsce po zastrzyku jest trochę zaczerwienione i spuchnięte. Czy to normalne?

Miejsce po zastrzyku może być czerwone, spuchnięte lub obolałe. Jest to normalne. Jeżeli okolica jest bardzo spuchnięta i są czerwone linie biegnące w górę ręki albo powoduje złe samopoczucie z gorączką, należy niezwłocznie skontaktować się z własnym lekarzem lub wydziałem zdrowia.

Pytania?



Możliwe, że nasuną się pytania w związku z podanym lekiem. Pytania te należy kierować do miejscowych wydziałów zdrowia odwiedzając ich strony:

Wydział Zdrowia Stanu Connecticut

<http://www.ct.gov/dph>

Centrum Epidemiologiczne (Center for Disease Control)

<http://emergency.cdc.gov/preparedness/>



410 Capitol Avenue
Hartford, CT 06134-0308

Phone: 860-509-8000
www.ct.gov/dph

Stan Connecticut



Masowe wydawanie leku Po POD: Co robić dalej?



Tel: 860-509-8000
www.ct.gov/dph

Co mi dolega, że muszę zażywać ten lek?



Otrzymałeś albo zastrzyk (szczepionkę ochronną), albo lek do zabrania do domu (antybiotyk lub środek antywirusowy). Lek ma zapobiec zachorowaniu lub

poprawić twój stan.

Jeżeli dostałeś leki do zabrania do domu, istotne jest zażywanie ich **DOKŁADNIE** według wskazówek na opakowaniu.

Arkusze „Informacje dla pacjenta” zawierać będzie informacje na temat zażywanych leków. Arkusz „Informacje dla pacjentów” należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdyż zawiera ważne informacje. W razie zagubienia arkusza lub potrzeby uzyskania go w innym języku, proszę skontaktować się z miejscowym lub stanowym wydziałem zdrowia w celu uzyskania kolejnego egzemplarza.

Należy słuchać miejscowych wiadomości na temat stanów zagrożenia lub zaleceń co do postępowania.

Antybiotyki i środki antywirusowe

Dostałem lek do zabrania do domu. Co to za lek?

Jeżeli dostałeś lek do domu, może to być antybiotyk albo środek antywirusowy. Może mieć postać pigułki lub płynu. Działanie antybiotyku polega na wspomaganiu organizmu w zwalczaniu bakterii, które mogą wywoływać chorobę. Działanie leku antywirusowego polega na wspomaganiu organizmu w zwalczaniu wirusów, które mogą wywoływać chorobę. Mogą być stosowane w celu poprawienia stanu zdrowia lub niedopuszczeniu do zachorowania.

Jak mam je zażywać?



Arkusze „Informacje dla pacjenta”, który dostałeś, zawiera informacje na temat sposobów zażywania tego leku. Aby lek był skuteczny, należy zażywać go **DOKŁADNIE** zgodnie z opisem na opakowaniu. Ważne jest zażywanie leku w wyznaczonym czasie i nieopuszczanie żadnych dawek. Jeżeli nie będziesz zażywać leku zgodnie ze wskazówkami, możesz bardzo poważnie zachorować. Musisz pamiętać o przechowaniu leku w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Czuję się już lepiej, czy mogę przestać zażywać lek?

Jest bardzo ważne, aby zażyć cały przydzielonego leku, nawet jeżeli poczujesz się dobrze. Nie zmniejszaj dawki i nie przestawaj zażywać leku bez zgody lekarza lub miejscowego wydziału zdrowia. Jeżeli nie skończysz zażywać całości leku, może on okazać się nieskuteczny i możesz się bardzo poważnie rozchorować.

Czy są jakieś skutki uboczne?

Arkusze „Informacje dla pacjenta” opisuje skutki uboczne, które może spowodować zażywanie tego leku. Jeżeli wystąpią poważne skutki uboczne wymienione na arkuszu „Informacje dla pacjenta”, natychmiast zadzwoń do swego lekarza lub miejscowego wydziału zdrowia.

Pigułka jest dla mnie za duża i trudno ją przełykać. Czy mogę ją skruszyć lub przeciąć na połowę?

Niektóre tabletki można kruszyć lub przecinać na połowę, inne zaś nie, w zależności od przepisanej dawki. Niektóre leki nie będą działać, jeżeli skruszy się je lub przetnie na połowę. Porozmawiaj z lekarzem lub kimś z miejscowego wydziału zdrowia o sposobach ułatwiających zażywanie leku; możesz też spytać, czy można go dostać w płynie.