

TARJETAS DE CITAS

Instalaciones de audiología

Los siguientes centros de audiología cuentan con el equipo especializado y la experiencia para realizar pruebas de audición a bebés y niños:

Connecticut Children's Medical Center
Hartford, Farmington, y Glastonbury, CT
(860) 545-9642 o (860) 837-6300

Lawrence & Memorial Hospital
Waterford, CT (860) 271-4900

UConn Speech & Hearing Clinic
Storrs, CT (860) 486-2629

Yale New Haven Children's Hospital
New Haven y Trumbull, CT (877) 925-3637

O visite www.ehdi-pals.org para obtener una lista de audiólogos pediátricos por localidad.

Marque con un círculo la instalación de arriba y rellene a continuación:

Fecha: _____ Tiempo: _____

Especialistas en CMV

Connecticut Children's Medical Center
Enfermedades infecciosas e inmunología
Hartford, CT (860) 545-9490

Yale New Haven Children's Hospital
Enfermedades infecciosas pediátricas
New Haven, CT (877) 925-3637

Marque con un círculo la instalación de arriba y rellene a continuación:

Fecha: _____ Tiempo: _____



Connecticut Department of Public Health Detección e intervención auditiva precoz

410 Capitol Avenue, MS # 11 MAT

Apartado de correos 340308

Hartford, CT 06134-0308

Voz: (860) 509-8251

Fax seguro: (860) 629-6965

Servicio de Retransmisión de Telecomunicaciones
7-1-1

<https://portal.ct.gov/ehdi>

Para más información sobre el cribado auditivo y el CMV congénito:



Si desea más información sobre los servicios para bebés sordos o con dificultades auditivas, póngase en contacto con:

Connecticut Birth to Three System

1-800-505-7000

www.birth23.org

Ninguna de las informaciones aquí contenidas pretende sustituir el consejo de un profesional de la salud.

Este folleto está destinado a ser entregado a los padres o tutores de cualquier bebé que no supere la prueba de audición para recién nacidos.


La impresión de este folleto está subvencionada por la Health Resources and Services Administration (HRSA) Grant H61MC00088. La información, el contenido y las conclusiones son responsabilidad del autor y no representan la posición o política oficial de la HRSA o del Gobierno de los EE.UU., ni debe inferirse ningún tipo de respaldo por parte de los mismos.

Rev. 13/06/2023

Sustituye a "Su bebé necesita otra prueba de audición/CMV"

Su bebé necesita: Una prueba del CMV y una prueba de audición

Preguntas frecuentes sobre el CMV y las pruebas de audición para padres y cuidadores



Fundada en 2000

Connecticut Department of Public Health
Programa de detección e intervención precoz de la sordera (EHDI)

Voz: (860) 509-8251 Fax: (860) 629-6965

<https://portal.ct.gov/ehdi>

Mi bebé no superó la prueba de audición para recién nacidos...

¿QUÉ TENGO QUE HACER AHORA?

Paso 1: Asegúrese de que su bebé ha sido sometido a la prueba del citomegalovirus congénito (CMV) antes de abandonar el centro de maternidad. Los centros de maternidad están obligados por ley a realizar pruebas de detección del CMV congénito cuando un bebé no supera la prueba de audición para recién nacidos. Su bebé debe someterse a la prueba antes de los 21 días de vida para determinar si es congénito. Consulte a su pediatra para obtener los resultados.

Paso 2: ¡Programe hoy mismo una prueba de diagnóstico auditivo con un audiólogo especializado en casos pediátricos! Esta prueba es mucho más exhaustiva que el cribado realizado al nacer y es la única forma de saber si existe una pérdida auditiva. Salvo excepciones médicas, su bebé debería someterse a la prueba de audición antes de los tres meses de edad. Para encontrar un audiólogo, consulte la lista de "**Instalaciones de audiología**" incluida.

Más información sobre el CMV congénito

¿Qué es el citomegalovirus congénito (CMV)? El CMV congénito es un virus que puede causar graves problemas de salud, retrasos en el desarrollo y es la principal causa de pérdida de audición en los bebés, que puede desarrollarse en cualquier momento durante los primeros años de vida. Ver **consejos de prevención del CMV congénito***

¿Qué ocurre si mi bebé tiene CMV congénito? Pida a su pediatra que le remita a un especialista en enfermedades infecciosas o póngase en contacto con uno usted mismo. Consulte la lista de "**Especialistas en CMV**" para obtener información de contacto. Además, es extremadamente importante que su bebé se someta a pruebas de audición con regularidad.

¿Existen servicios de desarrollo gratuitos para los bebés con CMV congénito?

Sí, póngase en contacto con el **Connecticut Birth to Three System (800-505-7000 o www.birth23.org)** para programar una evaluación.

Más información sobre las pruebas auditivas

¿Por qué el diagnóstico precoz de la pérdida auditiva es tan importante para el futuro de mi bebé?

El cerebro de los bebés intenta dar sentido a los sonidos que llegan a sus oídos en el transcurso de los acontecimientos cotidianos. Éste es el comienzo del desarrollo del lenguaje. Cuanto antes se DIAGNOSTIQUE a un bebé con pérdida auditiva y reciba servicios de INTERVENCIÓN relacionados con la audición, más probabilidades tendrá de alcanzar todo su potencial social, emocional e intelectual.

"Creo que mi bebé puede oír; voy a esperar a que le hagan una prueba de audición".

¡NO ESPERE! Las pruebas de audición deben realizarse lo antes posible tras el nacimiento, pero antes de los tres meses de edad. Muchos bebés con pérdida auditiva pueden oír algunos sonidos pero no los suficientes para desarrollar el habla y el lenguaje correctamente. No se puede saber observando e interactuando con el bebé si puede oír TODOS los sonidos necesarios para aprender el lenguaje. Las pruebas auditivas de diagnóstico son la única forma de saber con seguridad si su bebé tiene una pérdida auditiva.

¿Qué pasa si mi bebé pasa la prueba de audición?

Todos los niños que PASEN la prueba de audición o el screening auditivo deben someterse a una nueva prueba, al menos una vez, antes de los 36 meses de edad para detectar una pérdida auditiva de aparición tardía que, de otro modo, podría haber pasado desapercibida.

¿Qué ocurre si mi bebé tiene una pérdida auditiva o la desarrolla más adelante?

Póngase en contacto con el **Connecticut Birth to Three System (800-505-7000 o www.birth23.org)** para obtener servicios gratuitos de intervención auditiva para niños de hasta tres años. Se recomienda inscribirse lo antes posible o antes de los seis meses de edad. Asimismo, la **American School for the Deaf (860-570-2393 o www.asd-1817.org)** ha suscrito un contrato con el programa EHDI para prestar servicios gratuitos de familia a familia y otros apoyos centrados en la familia.

Factores de riesgo de la pérdida auditiva

Si alguna de las siguientes afecciones está presente o se ha producido, haga que controlen regularmente la audición de su hijo debido al mayor riesgo de que se desarrolle una pérdida auditiva más adelante:

- **Citomegalovirus congénito (CMV).**
- Preocupación del cuidador en relación con la audición, el habla, el lenguaje, el retraso o la regresión del desarrollo.
- Antecedentes familiares de pérdida auditiva infantil.
- Síndromes: Existen muchos síndromes asociados a la pérdida auditiva, visite: www.hereditaryhearingloss.org.
- Medicamentos ototóxicos o antibióticos de la familia de los aminoglucósidos (gentamicina).
- Infecciones in utero, como herpes, rubéola, sífilis, toxoplasmosis, Zika, etc.
- Estancia en la UCIN superior a 5 días.
- Malformaciones craneales o faciales, microcefalia congénita, microtia, atresia o traumatismo craneal.
- Exanguinotransfusión por hiperbilirrubinemia.
- Asfixia/Encefalopatía hipóxica Iquémica.
- Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).
- Quimioterapia.

*** Consejos de prevención del CMV congénito**

El CMV se transmite a través de los fluidos corporales. Ayude a reducir la propagación del CMV a las mujeres embarazadas:

- Lávese las manos con agua y jabón después de dar de comer a un niño, cambiar pañales, limpiarle la nariz o manipular sus juguetes.
- Evite compartir alimentos, bebidas o utensilios con los niños.
- No se lleve a la boca el chupete o el cepillo de dientes de un niño.
- No bese a los niños pequeños en la boca o cerca de ella.
- Limpie a menudo los juguetes, los cambiadores y las encimeras.